



ISFAHAN

M

مراقبت های آنژیوپلاستی



منابع:

1. مراقبت های جامع پرستاری در ICU ، CCU و دیالیز نویسنده: محمدرضا عسگری، محسن سلیمانی، سال ۱۳۹۵
2. TextBook Braunwald's-Heart Disease 2015

تهیه و تدوین: کمیته آموزش به بیمار

HOSPITAL

- * برای مدت ۲۴ ساعت در منزل از خم شدن، زورزدن و بلند کردن اشیاء سنگین خودداری کنید.
- * تا یک هفته از حمام کردن در وان خودداری کنید اما می توانید از دوش استفاده کنید.
- * توصیه می شود تا ۴۸ ساعت رانندگی نکنید و پس از رانندگی طولانی پرهیز کنید.
- * برای بازگشت به سر کار با پزشک خود مشورت کنید.
- * در صورتی که پزشک برای شما استنت گذاشته است، لازم است از داروها یکی که از لخته شدن خون جلوگیری می کند استفاده کنید. در مورد داروها و نحوه مصرف آنها از پزشک خود راهنمایی بخواهید.
- * در صورت بروز هریک از موارد زیر به پزشک اطلاع دهید:
خونریزی، تورم، گرفتگی و یا درد ناحیه کشاله ران و یا دست محل آنژیوپلاستی و تپ

با وجود آنژیوپلاستی و تعییه استنت احتمال تنگی مجدد در ۱۵-۲۰ درصد بیماران وجود دارد. لذا با رعایت رژیم غذایی، قطع مصرف سیگار، پیاده روی و فعالیت روزانه و متعادل کردن وزن می توانید از عود مجدد بیماری پیشگیری کنید. بازتوانی قلبی پس از آنژیوپلاستی در کنار داروها لازم است زیرا از سکته ی مجدد و گرفتگی مجدد عروق کرونری جلوگیری کرده و طول عمر شما را افزایش می دهد، بنابراین لازم است در مورد انجام آن با پزشک معالج مشاوره فرمائید.

۵

شماره تماس
03135130000

داخلی واحد آموزش به بیمار
772

- * در موارد نادر ممکن است در حین انجام آنژیوپلاستی به عمل جراحی اورژانسی بای پس (پیوند رگ های قلب) نیاز گردد.
- * ممکن است در حال آنژیوپلاستی به شما نیتروگلکسیرین داده شود که از عوارض آن سردد است. در صورت سردد به پرسنل بخش اطلاع دهید.

پس از آنژیوپلاستی:

- * لازم است که چند ساعت روی تخت بمانید و از حرکت دادن و خم کردن دست یا پای خود پرهیز کنید.
- * تا زمانی که وضعیت شما ثابت نشده از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. پس از تثیت وضعیت، در صورت اجازه پزشک یا پرستار آشامیدن مایعات را به تدریج شروع کنید.
- * پس از خارج شدن شیت شریانی (لوله) توسط پرستار، تا ۶ ساعت پا یا دستی که از طریق آن آنژیوپلاستی صورت گرفته است را حرکت ندهید، چون امکان بروز خونریزی وجود دارد.
- * در صورت بروز علائم زیر به پرستار اطلاع دهید:

تهوع و استفراغ، عرق سرد، گرگفتگی، سرگیجه، کهیر و خارش، درد قلبی، کرخت شدن، دردگرفتن و گزگز پا و یا دست

مراقبت های پس از ترخیص:

- * قبل از ترخیص از بیمارستان پانسمان محل آنژیوپلاستی برداشته می شود و نیازی به پانسمان مجدد نیست اما لازم است این محل را تمیز و خشک نگه دارید.

۴

اصفهان - بلوار کشاورز - سه راه سیمین -
خیابان جانbazان - انتهای بلوار شهید بخشی

- * در مورد مصرف تمامی داروهایتان با پزشک خود مشورت کنید.
- بعضی داروها قبل از آثیوگرافی و آثیوپلاستی باید قطع شود.
- (مانند قرص وارفارین، مت فورمین و آسپرین)
- * در بخش از شما آزمایش خون، نوار قلب و عکس قفسه سینه گرفته خواهد شد و آثیوکت که وسیله‌ای است جهت تزریق سرم و یا دارو برای شما تعییه خواهد شد.
- * باید قبل از بستری شدن هر دو طرف کشاله ران تمیز و موهای زاید زیر ناف تا بالای زانو تراشیده شود.
- * قبل از آثیوپلاستی باید حداقل ۶ ساعت ناشتا باشد.

اگر مبتلا به دیابت هستید، مصرف قرص این بیماری یا انسولین در صبح روز عمل باید قطع گردد.

حين آثیوپلاستی:

- * عمل در یک اتفاق مخصوص انجام می‌شود. ریتم قلب و فشارخون حین آثیوپلاستی به طور مداوم کنترل می‌گردد. اتفاق در بعضی مواقع برای گرفتن فیلم رادیولوژی تاریک خواهد شد.

به موارد زیر توجه کنید:

- * هنگامی که پزشک از شما می‌خواهد تغییر وضعیت داده یا سرفه کنید، با او حتماً همکاری کنید.
- * در حین عمل اگر دچار پیش قلب، سرفه و درد قلبی شدید، به پرستار اطلاع دهید.
- * موقع تزریق ماده حاجب ممکن است احساس گرما خصوصاً در ناحیه سر داشته باشد که طبیعی بوده و بعد از یک دقیقه برطرف می‌شود.

آثیوپلاستی چگونه انجام می‌شود؟ مقدمات روشن انجام:

آثیوپلاستی شبیه آثیوگرافی است که به یهودی عمومی نیاز نداشته و با انجام بی‌حسی موضعی صورت می‌گیرد. اما برخلاف آثیوگرافی که تنها یک روش تشخیصی است در آثیوپلاستی پزشک یک سیم بالون دار را وارد رگ‌های کرونر قلب کرده و از این طریق آن را به طرف محل تنگی هدایت می‌کند، سپس در محل تنگی، بالون را باز کرده پس از چند ثانیه آن را خالی می‌کند. این عمل چندین مرتبه تکرار می‌شود تا به تدریج رگ باز شود. در بعضی موارد پزشک یک استوانه فنری مارپیچ بسیار کوچک بنام استنت را در محل تنگی رگ فرار می‌دهد تا از تنگی مجدد جلوگیری شود.

آمادگی‌های لازم قبل از آثیوپلاستی:

- * حداقل یک روز قبل از آثیوپلاستی در بخش بستری می‌شوید (مگر در موارد اورژانس)
- * به هنگام بستری شدن تمامی مدارک پزشکی خود شامل گزارش اکوکاردیوگرافی، آزمایش خون و ادرار، تست ورزش، سی‌تی اسکن، نوار قلب و ... را به همراه داشته باشد.
- * در صورت داشتن سابقه بیماری کلیوی، تنفسی و خونی، حساسیت به دارو یا مواد غذایی به خصوص مواد یددار مانند ماهی به پزشک معالج اطلاع دهید.
- * قبل از آثیوپلاستی داروی پلاویکس (برای پیشگیری از ایجاد لخته به وسیله پلاکت‌های خون) تجویز می‌شود که معمولاً مصرف آن از ۲ روز قبل شروع می‌شود و حداقل ۸ قرص باید مصرف شود.

قلب یک تلمیبه عضلاتی است که به طور مداوم در حال کار کردن است تاخون را به سرتاسر بدن پمپ کند. برای این که بتواند این کار را انجام دهد نیاز دارد که به عضله خودش هم خونرسانی مناسبی صورت پذیرد. رگ‌هایی که خون را به عضله قلب می‌رسانند شریان (رگ)‌های کرونری نامیده می‌شوند. در بعضی از بیماران، به دلیل رسوب چربی در دیواره، این رگ‌ها تنگ می‌شوند و در نتیجه خون و اکسیژن به اندازه کافی به عضلات قلب نمی‌رسد. در این صورت، در حالت استراحت ممکن است مشکلی برای فرد ایجاد نشود، اما وقتی که قلب مجبور باشد کار بیشتری انجام دهد، مثلاً در هنگام فعالیت، شریان‌های کرونری نمی‌توانند خون و اکسیژن موردنیاز را به عضلات قلب برسانند، در نتیجه شخص دچار درد قفسه سینه می‌گردد. در چنین موقعی اگر فرد کمی استراحت کند، درد معمولاً از بین خواهد رفت. اگر رگ‌های قلبtan دچار گرفتگی شده باشد، ممکن است پزشک قلب و عروق، آثیوپلاستی را به عنوان یک روش درمانی به شما پیشنهاد نماید.

آثیوپلاستی چیست؟

یک روش درمانی در بیماری‌های قلبی - عروقی است که هدف آن گشاد کردن رگ‌های تنگ شده قلب و در نتیجه بهبود خون رسانی به عضله قلب، کاهش دردهای قفسه سینه و افزایش طول عمر بیمار می‌باشد.

