




میلا

اختلالات

کیسه صفرا



☀ مراقبت ها:

- ۱- از مصرف تخم مرغ، گوشت پرچرب، خامه، پنیر، الکل، میوه و سبزیجات نفاخ، غذاهای سرخ شده و پرچرب اجتناب کنید.
- ۲- در صورت نیاز به مسکن از مصرف مورفین خودداری شود.
- ۳- در صورت افزایش یا کاهش وزن جهت تغییر میزان دوز دارو حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.
- ۴- سعی کنید افزایش وزن نداشته باشید.
- ۵- از مصرف سیگار اجتناب کنید.
- ۶- داروهای حل کننده سنگ را با غذا یا شیر مصرف کنید.
- ۷- از بلند کردن اجسام سنگین و ورزش های سنگین برای ۴ تا ۶ هفته خودداری کنید.
- ۸- طبق دستور پزشک تست های کبدی و انعقادی را انجام داده و جواب را به پزشک اطلاع دهید.
- ۹- طبق دستور پزشک جهت ادامه درمان به مطب مراجعه کنید.


☀ علائم هشدار:

- در صورت علائم زیر به بیمارستان یا پزشک اطلاع دهید:
- ۱- تب
 - ۲- درد شکم
 - ۳- تهوع و استفراغ
 - ۴- تعریق فراوان
 - ۵- رنگ پریدگی



۱- سنگ های کیسه صفرا:

از مواد جامد موجود در صفرا تشکیل می شوند و از نظر شکل، اندازه و ترکیب متنوعند.




۲- عفونت کیسه صفرا (کوله سیستیت):

عفونت حاد کیسه صفرا یکی از عوارض سنگ کیسه صفرا است. سنگ جریان خروجی صفرا را مسدود می کند و باعث التهاب و ورم صفرا می شود.



علل

- ۱- چاقی
- ۲- رژیم غذایی پرچرب
- ۳- تنگی مجرای صفراوی
- ۴- سابقه خانگی



علائم بالینی

- ۱- درد و سفتی شکم
- ۲- تغییر رنگ ادرار یا مدفوع (زرد تیره)
- ۳- تب
- ۴- زردی یا یرقان
- ۵- خارش شدید

درمان

- ۱- تغذیه ای - دارویی (مثل سنگ شکن)
- ۲- جراحی

