

اقدامات پس از دریافت دارو (به صورت خوراکی یا تزریقی)

چه اقداماتی پس از دریافت دارو به صورت خوراکی یا تزریقی باید انجام دهم؟

۱. بیمارانی که دارو دریافت می کنند (به صورت خوراکی یا تزریقی) باید به مدت ۲۴ ساعت از زنان باردار و کودکان زیر ۱۲ سال، دو متر فاصله بگیرند.
۲. بیمارانی که دارو دریافت می کنند (به صورت خوراکی یا تزریقی) باید در سالن انتظار پس از تزریق و همراهان در سالن انتظار همراه بمانند.
۳. ورود کودکان و زنان باردار به جز کسانی که اسکن برای آن ها تجویز شده است به سالن انتظار پس از تزریق ممنوع است.
۴. بیماران محترم، قبل از انجام هر اسکن، تحویل مدارک پزشکی مربوط به بیماری (عکس، سونوگرافی، اکو و) به کارشناس مرکز الزامی است.
۵. بیماران پس از تزریق رادیودارو باید پنبه ی خود را در سطل های سربی (فلزی و قرمز رنگ) بریزند.
۶. بیماران محترم بعد از تزریق رادیودارو مصرف آب و مایعات و دفع مکرر ادرار، به روند تصویربرداری و کاهش اشعه کمک خواهد کرد (به جز اسکن قلب).
۷. بانوان شیرده که دارو دریافت می کنند (به صورت خوراکی یا تزریقی) باید به مدت ۲۴ ساعت شیردهی را قطع کرده و در آن مدت شیر خود را دوشیده و دور بریزند. سپس بعد از ۲۴ ساعت شیردهی را از سر بگیرند.
۸. زنانی که برای آن ها اسکن تجویز شده است، باید پزشک و کارشناس مرکز را از بارداری، احتمال بارداری و یا شیردهی خود با خبر سازند.
۹. داروهای رادیواکتیو تجویزی به بیماران حاوی کمترین مقدار ممکن اشعه بوده و بدون اثرات جانبی تب زا و یا حساسیت زا بوده و برای کلیه بیماران اعم از بیماران قلب، کلیوی و ... قابل استفاده می باشد.
۱۰. برای هر اسکن حدود ۴ ساعت زمان در نظر بگیرید. بیماران بیمارستانی و اورژانسی در الویت تصویربرداری خواهند بود.
۱۱. زمان پذیرش شما زمان انجام تصویر برداری شما نبوده و صرفا به معنای اعلام حضور شما در مرکز و آماده سازی تجهیزات و داروهای مرتبط با شما می باشد.

