



میلا

راهنمای

مصرف کلگزان



عوارض جانبی دارو:

- در صورت عوارض احتمالی زیر در حین مصرف دارو حتماً به پزشک اطلاع دهید:
- ۱- کبودی یا قرمزی پوست
 - ۲- ایجاد ندول در محل تزریق
 - ۳- استفراغ یا خلط خونی
 - ۴- خون در ادرار یا مدفوع
 - ۵- خونریزی غیر طبیعی در هر جای بدن



۵

۴



واحد آموزش به بیمار

شماره پمفلت: IMH.PE.CV.09/01

شماره تماس بیمارستان
03135130000
داخلی واحد آموزش به بیمار

772

اصفهان - بلوار کشاورز - سه راه سیمین -
خیابان جانبازان - انتهای بلوار شهیدبخشی

نبايدها:

- 1- نبايد دارو را در محل زخم يا كبودى پوست تزريق كنيد.
- 2- پس از تزريق محل تزريق را ماساژ ندهيد. اينكار باعث ايجاد كبودى در زير پوستان ميگردد.
- 3- دارو را نبايد منجمد كرد (از يخ زدگى محافظت شود).
- 4- همزمان با مصرف كلگزان نبايد آسپيرين ، دارو هاى ضد التهاب ، ضد آلرژى ، سرماخوردگى و مسكن استفاده كرد. در اين زمينه حتماً با پزشك مشورت كنيد.



بايدها:

- 1- قبل از تزريق اجازه دهيد الكل محل تزريق خشك شود.
- 2- چين پوستى شكم را تا پايان تزريق به آرامى نگاهداريد.
- 3- دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنيد.
- 4- هنگام اصلاح ، استفاده از چاقو و ابزار برنده دقت كافى به عمل آوريد.
- 5- در صورت مصرف دارو هاى مكمل و گياهى با پزشك مشورت كنيد.

كلگزان براى پيشگيرى از ايجاد لخته در خون وريدهاى عمقى بدن مصرف مى شود.

شرائط نگهدارى دارو

- 1- از يخ زدگى آن درون يخچال جلوگيرى كنيد.
- 2- كلگزان را در دماى اتاق (۲۵ درجه) و دور از نور و رطوبت نگهدارى كنيد.

روش صحيح تزريق كلگزان

- 1- تزريق به صورت زيرپوستى هر روز سر ساعت معين طبق دستور پزشك مى باشد.
- 2- در حالت نشسته يا خوابيده تزريق را دور ناف و با فاصله ۵ سانتى مبرى ناف با گرفتن چين شكم انجام دهيد.
- 3- محل را قبل از تزريق با پنبه الكل تميز كنيد.
- 4- تزريق بعدى را با فاصله از جاي تزريق قبلى انجام دهيد و محل تزريق را هر بار عوض كنيد.
- 5- سرنگ را با زاويه ۹۰ درجه وارد كنيد.
- 6- سرنگ را به روش ايمن دور بيندازيد. بطورى كه سر سوزن باعث آسيب به خودتان يا اطرافيان نگردد.