



میلاد

بیوپسی کبد



Hospital

واحد آموزش به بیمار

شماره پمفلت: IMH.PE.CG.1/01

* از بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت شدید تا یک هفته پرهیز نمائید.

عوارض و خطرات احتمالی:

- * خونریزی
- * آسیب به کیسه صفرا
- * پاره شدن روده
- * مرگ در موارد بسیار نادر


اقدامات لازمه بعد از نمونه برداری کبد

بعد از ترخیص از بیمارستان بهتر است بیمار تا چند هفته پس از آن از انجام فعالیت های بدنی شدید اجتناب نماید. درد احتمالی به میزان کم تا چند هفته باقی مانده و به تدریج کاهش می یابد. شایان ذکر است که در موارد درد شدید، احساس تنگی نفس، خونریزی از دستگاه گوارش، خونریزی یا ترشحات از محل نمونه برداری کبد، تهوع و استفراغ به پزشک مراجعه شود. و سرگیجه باید سریعاً پانسمان محل نمونه برداری روز بعد از انجام نمونه برداری کبد در صورت عدم وجود ترشحات یا خونریزی قابل برداشتن است و بیمار می تواند استحمام نماید.

اقدامات پس از نمونه برداری:

- * باید روی سمت راست خود دراز بکشید و یک ملحفه تا خورده زیر ناحیه نمونه برداری شده گذاشته می شود.
- * ممنوعیت نوشیدن آب و غذا تا ۲ ساعت پس از انجام نمونه برداری ادامه خواهد داشت.
- * بعد از انجام نمونه برداری، به مدت شش ساعت در بخش اندوسکوپی تحت نظر خواهید بود و پرستار نبض و فشارخون شما را اندازه گیری خواهد نمود. در صورت عدم خونریزی مرخص خواهید شد ولی در صورت ادامه دل درد و بروز خونریزی به بخش منتقل خواهید شد.
- * خونریزی از ناحیه نمونه برداری بلافاصله باید به پرستار اطلاع داده شود.
- * بعد از ترخیص در صورت بروز تب، درد شدید و یا هرگونه ترشح غیر معمولی (مثل ترشح خونی) از محل نمونه برداری پزشک یا پرستار را مطلع کنید.
- * بیست و چهار ساعت بعد از نمونه برداری می توانید پانسمان محل نمونه برداری را بردارید و ۴۸ ساعت بعد می توانید حمام کنید.

بیوپسی به معنی نمونه برداری از بافت ها است. بیوپسی روشی تشخیصی است که به توسط آن پزشک مقداری از بافت بدن را خارج کرده و برای بررسی به آزمایشگاه بافت شناسی می فرستد. در آزمایشگاه بافت شناسی یا پاتولوژی پزشک متخصص پاتولوژیست بافت های ارسالی توسط پزشک را در زیر میکروسکوپ بررسی کرده و بیماری های احتمالی را که در بافت وجود دارد تشخیص داده و به پزشک گزارش می دهد.




نمونه برداری از کبد (Liver Biopsy)

نمونه برداری از کبد به معنی برداشتن مقدار کوچکی از بافت کبد است که معمولاً بوسیله یک نیادل (سرسوزن) انجام می شود. هدف از انجام نمونه برداری ، بررسی سلول های کبد و تشخیص اختلالات کبد می شود.

اقدامات قبل از انجام نمونه برداری :

- * برای تشخیص اختلالات انعقادی باید آزمایش خون انجام شود؛ در صورت وجود این نوع مشکلات، نمونه برداری انجام نخواهد شد.
- * یک روز قبل از آزمایش، حمام کنید و موهای زاید ناحیه شکم را کاملاً برطرف نمایید.
- * روز قبل از نمونه برداری برای بستری شدن باید به بیمارستان مراجعه نمایید.
- * در هنگام مراجعه به بیمارستان، نتایج آزمایشات و سونوگرافی شکم را به همراه داشته باشید.
- * در صورتی که سابقه ابتلاء به بیماری های خونی دارید، حتماً پزشک و پرستار را مطلع کنید.
- * در صورتی که آسپرین، بروفن و یا وارفارین مصرف می کنید، یک هفته قبل از نمونه برداری با نظر پزشک مصرف داروها را متوقف کنید زیرا این داروها احتمال خونریزی حین نمونه برداری را افزایش می دهند.
- * شش ساعت قبل از انجام نمونه برداری از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.



اقدامات حین نمونه برداری :

- * برای انجام نمونه برداری روی یک تخت دراز می کشید.
- * محل نمونه برداری (قسمت پائینی دنده ها در طرف راست شکم) توسط پزشک کاملاً ضدعفونی و توسط آمپول بی حسی، بی حس می شود این آمپول به کاهش درد شما در حین نمونه برداری کمک می کند.
- * ممکن است از شما خواسته شود تا چند بار نفس عمیق بکشید و سپس نفستان را حبس کنید تا نمونه برداری با موفقیت انجام شود.
- * نمونه گرفته شده توسط همراه شما به آزمایشگاه پاتولوژی برده می شود و جواب آن را یک هفته تا ۱۰ روز بعد، از همان محل می توانید تحویل بگیرید و در نوبت مراجعه بعدی به دکتر ارائه دهید.