



سپهر



در مصرف دیپارون (سیناکلست) چه نکاتی را رعایت کنیم؟

این دارو سطح هورمون پاراتیروئید و کلسیم و فسفر را در بدن کاهش می دهد.

این دارو در بیمارانی که مدت زمان زیادی است که تحت دیالیز قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد.

قرص ها شکسته و تقسیم نشود.



در مصرف رفاژل (سولامر) چه نکاتی را رعایت کنیم؟

- ✓ این دارو به فسفر مواد غذایی متصل شده و آن را از طریق دستگاه گوارش دفع می کند.
- ✓ از عوارض آن یبوست است.
- ✓ باید مصرف مواد غذایی حاوی فسفر مانند آجیل و لبنیات را کاهش داد.
- ✓ مصرف این دارو باید با فاصله ی ۱ الی ۳ ساعت از داروهایی مانند: داروهای ضد تشنج، وارفارین، سیپروفلوکساسین صورت گیرد.
- ✓ این دارو باید همراه غذا یا بلافاصله بعد از آن مصرف شود.

در مصرف نفروویت چه نکاتی را رعایت کنیم؟

- ✓ مکمل غذایی مخصوص بیماران کلیوی است.
- ✓ همزمان با قرص آهن مصرف نشود.
- ✓ بهتر است بعد از دیالیز و قبل از درمان بعدی میل شود.

داروهای دیالیز

آدرس: سه راه سیمین، خیابان جانبازان، انتهای بلوار شهیدبخشی. تلفن: ۰۳۱۳۵۱۳۰۰۰۰ ، داخلی واحد آموزش به بیمار: ۷۷۲

کد پمفلت: E0331

آموزش داروهای مصرفی:

در تزریق ونوفر (آهن تزریقی) چه نکاتی را رعایت کنیم؟

- ✓ جهت درمان کم خونی می باشد.
- ✓ باید به صورت رقیق شده و داخل وریدی تزریق شود.
- ✓ نیازی به نگهداری در یخچال ندارد.
- ✓ با هیچ دارویی نباید تزریق شود.
- ✓ تزریق حتما باید در بیمارستان انجام شود.
- ✓ مصرف همزمان با آهن خوراکی توصیه نمی شود.



در مصرف کربنات کلسیم چه نکاتی را رعایت کنیم؟

- ✓ این دارو باعث کاهش جذب فسفر می شود.
- ✓ به صورت قرص خوراکی می باشد.
- ✓ از عوارض آن می توان به بیبوست، تشنگی، تهوع و پرادراری اشاره کرد.
- ✓ آنتی بیوتیک ها و آهن خوراکی جذب این دارو را مختل می کند. بنابراین با فاصله زمانی از هم استفاده شود.



در مصرف کلسی تریول چه نکاتی را رعایت کنیم؟

- ✓ این دارو فرم فعال شده ویتامین دی است که متابولیسم کلسیم و فسفات را تحت تاثیر قرار می دهد.
- ✓ این دارو به شکل کپسول ژلاتینی و آمپول یک میکروگرم می باشد.
- ✓ مهم ترین عارضه ی آن افزایش کلسیم و فسفر است.



در مصرف فورزماید (لازیکس) چه نکاتی را رعایت کنیم؟

- ✓ ادرار آور و کنترل کننده فشار خون است.
- ✓ این دارو به طور معمول ۲ بار در روز تجویز می شود که در این صورت بهترین زمان مصرف دارو صبح و عصر است.

۳

- ✓ در صورت احساس خشکی دهان می توانید از آدامس و آب نبات فاقد شکر استفاده کنید.
- ✓ در صورت تاری دید، سردرد، احساس خستگی شدید به پزشک مراجعه کنید.
- ✓ این دارو سطح سدیم و پتاسیم را در بدن شما تغییر می دهد به همین دلیل لازم است آزمایشات دوره ای انجام شود.



در تزریق اپرکس (اریتروپویتین) چه نکاتی را رعایت کنیم؟

- ✓ آمپول خون ساز است و به صورت زیرجلدی تزریق می شود.
- ✓ در یخچال و دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود و از یخ زدگی آن جلوگیری شود. از نور مستقیم خورشید محافظت شود.
- ✓ در صورت فشار خون بیش تر از ۱۶۰/۹۰ از تزریق آن اجتناب کنید و با پزشک خود مشورت کنید.

۴

۲