



دیگوکسین

آدرس: سه راه سیمین، خیابان جانبازان، انتهای
بلوار شهیدبخشی. تلفن: ۰۳۱۳۵۱۳۰۰۰۰ ، داخلی
واحد آموزش به بیمار: ۷۷۲

کد پمفلت: E0337

برخی از آن‌ها اشاره شده است. همیشه قبل از استفاده ی داروی جدید و یا موارد اشاره شده، پزشک معالج و یا داروساز خود را مطلع سازید.

اریترومایسین	ریفامپین
اسپیرونولاکتون	سولفاسالازین
آملودیپین	فورزماید
آمیودارون	کارودیلول
آنتی اسیدها	کلاریترومایسین
ایتراکونازول	کلستیرامین
ایندومتاسین	کینیدین
آلپرازولام	لووتیروکسین
پاروکستین	متوپرولول
پروپرانولول (ایندرال)	متوکلوپرامید
پنی سیلامین	مکمل حاوی کلسیم
تتراسایکلین	نیفدیپین
داروهای ملین (سی لاکس)	وراپامیل
دیلتiazم	هیدروکلروتیازید

منابع جهت مطالعه بیشتر:

* www.rxlist.com on July 2014

* drug information handbook, 21 2012, 21 2013th edition

* drug interaction facts, 2013, David S Tatro

اگر مصرف یک دوز از دیگوکسین را فراموش کردم چه کاری باید انجام دهم؟

به محض یادآوری دوز فراموش شده آن دوز مصرف شود. اگر تا زمان مصرف دوز بعد کمتر از ۱۲ ساعت باقی مانده، دوز فراموش شده را رها کنید و مصرف دارو را طبق روال معمول ادامه دهید. (هرگز به دلیل فراموشی، دوز داروی بعدی خود را افزایش ندهید).

اگر من دوز زیادی از دارو را مصرف کنم چه اتفاقی روی می دهد؟

اگر فکر می کنید دوز زیادی از دارو را مصرف کرده اید، هر چه سریع تر به مراکز پزشکی مراجعه نمایید. (برخی از علائم مسمومیت با این دارو عبارتند از: تهوع و استفراغ، اسهال، تاری دید و تپش قلب).

برای رژیم غذایی خود به چه نکاتی باید توجه کنم؟

در صورتی که علاقه زیادی به سالاد فصل دارید، آن را با فاصله ی زمانی از داروی دیگوکسین مصرف نمایید (غذاهای سرشار از فیبر و سبوس می تواند جذب داروی دیگوکسین را مختل نمایند).

آیا می توانم دیگوکسین را همزمان با داروهای دیگر مصرف کنم؟

دیگوکسین با بسیاری از دارو ها تداخل دارد و در جدول به

دیگوکسین چیست؟

دیگوکسین دارویی است که از گیاه انگشتانه(دیژیتال) استخراج شده و بر عملکرد قلب تاثیر گذار می باشد.

چرا دیگوکسین مصرف می کنیم؟

دیگوکسین در درمان مواردی مانند نارسایی احتقانی قلب همچنین اختلالات نامنظمی ضربان قلب به کار می رود. دیگوکسین به ایجاد ضربان قلبی قوی تر و ضرب آهنگی (ریتمی) منظم تر کمک می کند.

در هنگام مصرف این دارو با چه عوارضی ممکن است مواجه شوم؟

در صورت بروز هر یک از نشانه های زیر مصرف دیگوکسین را قطع کرده و سریعا با پزشک خود تماس حاصل فرمایید:

- بی اشتهايي، تهوع، استفراغ و اسهال
- جوش یا راش پوستی
- تنگی نفس
- احساس تپش قلب(احساس تکان خوردن شدید قلب در قفسه سینه)
- تاری دید(مشاهده یک هاله ی رنگی اطراف اشیا)
- دردهای عصبی، سردرد، ضعف و احساس گیجی
- ضعف عضلانی و خستگی
- تورم دست و پاها



در هنگام مصرف این دارو چه نکاتی را باید رعیت

کنیم؟

- ❖ به طور مداوم با پزشک خود در ارتباط باشید تا بهبودی شما زیر نظر باشد.
- ❖ در صورت وجود آلرژی به دارو از مصرف آن خودداری نمایید.
- ❖ از قطع مصرف ناگهانی دارو بدون نظر پزشک خود جدا خودداری نمایید. حتی اگر احساس بهبودی کردید(در صورتی که به هر دلیل چند نوبت از دارو را مصرف نکردید برای از سرگیری مصرف به پزشک خود مراجعه کنید.
- ❖ یک برگه ی شناسایی داشته باشید که نشان دهد شما این دارو را مصرف می نمایید.
- ❖ در صورتی که میزان کمتری از یک قرص برای شما نسخه شده، در هنگام نصف کردن قرص دقت نمایید.
- ❖ دارو را در دمای اتاق و دور از رطوبت نگه دارید.
- ❖ در آب و هوای گرم از انجام فعالیت های شدید که منجر به از دست دادن آب بدن می شود دوری نمایید.
- ❖ داروها و مواد بسیار زیادی مانند ویتامین ها، مواد معدنی و فرآورده های گیاهی وجود دارند که با این دارو تداخل دارند.



- ❖ حتما قبل از استفاده از این گونه داروها با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- ❖ سعی کنید همیشه لیستی از کل داروهای مصرفی خود را جهت اطلاع به پزشکتان به همراه داشته باشید.
- ❖ با توجه به تولید شکل ها و بسته بندی های مختلف این دارو در شرکت های سازنده، در زمان دریافت دارو حتما در خصوص نام داروهای دریافتی خود و مقایسه با داروهای قبلی از پزشک، داروساز و یا پرستار خود سوال نمایید.
- ❖ دارو را با یک لیوان پر آب و همیشه در یک زمان مشخص روز مصرف کنید.
- ❖ اگر از فرم مایع دارو استفاده می کنید حتما از قطره چکان و یا ظرف مدرجی که در جعبه دارو موجود است جهت اندازه گیری و مصرف استفاده نمایید.

در هنگام مصرف این دارو چه تست هایی باید انجام دهیم؟

پزشک شما به منظور از ایجاد عوارض شدید توسط این دارو، بررسی عملکرد کلیه و آزمایشات خونی تعیین غلظت دارو را برای شما معین می نماید. سعی کنید طبق برنامه ی تنظیمی ارائه شده توسط پزشکتان آزمایشات را انجام دهید.