


هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی (HSG):

یکی از روش های تشخیصی برای بررسی علت تاخیر باروری است که در آن از نوعی اشعه ایکس برای بررسی رحم و لوله های رحم زنانی که دچار مشکلات ناباروری هستند همچنین برای بررسی علل رحمی سقط مکرر جنین استفاده می شود.

گاهی اوقات با استفاده از عکس رنگی از رحم گرفتگی لوله های رحم (فالوپ) باز شده و امکان بارداری بیمار فراهم می شود.



عکس رنگی رحم چیست؟

در طی عکسبرداری رنگی از، رحم و لوله های رحمی از مواد حاجب محلول در آب پر می شود و به این ترتیب علاوه بر مشخص شدن باز بودن یا انسداد لوله های رحم به تشخیص اختلالات رحمی مثل تومور رحم سپتوم یا دیواره ، رحم تک شاخ یا دوشاخ نیز امکان پذیر می شود.

نحوه آمادگی قبل از عکس برداری از رحم:

بهترین زمان انجام عکس رنگی از رحم یک هفته پس از اتمام قاعدگی و قبل از تخمک گذاری است. توصیه می شود در این مدت از مقاربت پرهیز کرده و داروی تحریک تخمدان استفاده نکرده باشید تا از عدم بارداری شما در طول این آزمایش اطمینان حاصل شود.

پزشک ممکن است از شما بخواهد تا در شب قبل از این روش ، یک مسهل یا تنقیه را برای تخلیه روده خود استفاده کنید. قبل از عمل برای به حداقل رساندن هر گونه ناراحتی احتمالی ، ممکن است یک آرام بخش خفیف و یا داروی ضد درد خوراکی دریافت کنید. برخی از پزشکان یک داروی آنتی بیوتیک را قبل و یا پس از عمل تجویز می کنند. در صورت عفونت واژن یا دهانه رحم حتما قبل از انجام عکس برداری ، جهت درمان عفونت اقدامات لازم انجام شود.

روش انجام:

این روش معمولا به صورت سرپایی و مانند معاینه زنان و طی ۳۰ دقیقه با وارد کردن وسیله معاینه و کاتتر و تزریق ماده حاجب انجام می شود.

عوارض:

این آزمایش ناراحتی خفیفی به همراه خواهد داشت. هنگامی که کاتتر وارد واژن شده و ماده حاجب تزریق می شود، ممکن است کمی ناراحتی و گرفتگی عضلات بوجود بیاید، اما بزودی برطرف خواهد شد. همچنین ممکن است سوزش خفیف صفای (پوشش حفره شکمی) ایجاد شود و باعث گسترش درد در قسمت تحتانی شکم گردد، اما در حد بسیار کم و موقتی است. بسیاری از زنان طی چند روز پس از معاینه، لکه بینی واژینال را تجربه می کنند که طبیعی است.

برای انجام عکس رنگی رحم چه آمادگی لازم است؟


قبل از انجام آزمایش باید رضایت نامه ای را امضا کنید اگر سابقه آلرژی به رنگ اشعه ایکس را دارید و یا اگر اخیرا در حفره لگنی دچار عفونت شده اید، و یا اگر احتمال بارداری وجود دارد و یا سابقه هیدروسالپنکس یا خون ریزی نامنظم داشته اید پزشک خود را در جریان قرار دهید.

هواشانی

بیمارستان میلاد اصفهان
ISFAHAN MILAD HOSPITAL



عکس رنگی رحم



شماره تماس بخش نازایی
03135130530



عوارض یا خطرات:

انجام هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم ممکن است با خونریزی اندک واژن و کرامپ لگن به مدت چند روز بعد از انجام آزمایش همراه باشد. اگر خونریزی سنگین به همراه تب و یا افزایش درد در ناحیه لگن داشتید باید با پزشک خود تماس بگیرید. برخی خانم ها ممکن است نسبت به ماده رنگی تزریق شده آلرژی داشته باشند. از عوارض عکس رنگی رحم، بروز عفونت می باشد که از هر ۱۰۰ بیمار در ۳ نفر اتفاق می افتد. اغلب پزشکان از رنگ محلول در آب استفاده می کنند این رنگ ها معمولاً رحم را تحریک نمی کند

در این روش از انجایی که از اشعه ایکس استفاده می شود، فرد کمی در معرض تابش قرار دارد و احتمال آسیبی را در پی ندارد. اما بسیار اهمیت دارد که هنگام انجام هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم باردار نباشید.