



سازمان  
بیماریها

## کاترهای دیالیز

آدرس: سه راه سیمین، خیابان جانبازان، انتهای  
بلوار شهیدبخشی. تلفن: ۰۳۱۳۵۱۳۰۰۰۰ ، داخلی  
واحد آموزش به بیمار: ۷۷۲

کد پمفلت: E0329



### در صورت بروز چه علایمی به پزشک اطلاع دهیم؟

- ✓ وجود قرمزی، گرمی یا درد در ناحیه ی کاتتر
- ✓ وجود ترشحات از ناحیه ی خروجی کاتتر
- ✓ تورم یا خارش در اطراف ناحیه خروجی کاتتر
- ✓ بروز تب همراه با یکی از علایم بالا
- ✓ بیرون آمدن قسمتی از لوله
- ✓ در صورتی که کاتتر به صورت ناگهانی و تصادفی کشیده شده و در اطراف کاتتر خونریزی مشاهده شود.
- ✓ در صورت بروز تنگی نفس یا سرفه های مکرر شدید



- هیچ نوع پمادی را بدون اجازه ی پزشک روی کاتتر نمالید.
- در صورت باز شدن سرپیچ ها و کلامپ های قرمز و آبی فوراً آن ها را ببندید.
- اگر به هر دلیلی لوله از محل خود خارج شد سعی نکنید آن را به محل خود بازگردانید.
- کاتتر دائم با الکل و کاتتر موقت با بتادین ضدعفونی شود.
- اگر دیالیز به هر علتی قطع شد و کاتتر با صلاحدید پزشک باقی ماند، هفته ای چند بار به بیمارستان جهت هیپارنه کردن کاتتر برای جلوگیری از انسداد و لخته شدن آن مراجعه کنید.
- زمان خارج کردن کاتتر را از پزشک خود بپرسید.
- هرگز کاتتر را به سمت داخل یا خارج حرکت ندهید.

## کاتتر دیالیز چیست؟

کاتتر دیالیز خونی یک لوله ی پلاستیکی است که داخل وریدهای بزرگ در گردن یا کشاله ران گذاشته می شود. این کار معمولا توسط یک جراحی کوچک انجام می شود. این کاتترها به دو دسته موقت و دائم تقسیم می شوند که بر اساس نوع لوله، روش تعبیه و جنس لوله با یکدیگر متفاوت هستند

## کاتتر موقت چیست؟

این کاتترها اگر در ناحیه ی کشاله ی ران گذاشته شوند، ۴۸ ساعت تا یک هفته قابل استفاده اند و اگر در ناحیه ی گردن گذاشته شوند از ۳ روز تا ۳ هفته قابل استفاده هستند.




- بعد از هر دیالیز بایستی پانسمان کاتتر تعویض شود و در صورت مشاهده ی علائم عفونت (تب، درد، قرمزی، گرم بودن و خروج ترشحات از کاتتر) هر چه سریع تر به پزشک مراجعه شود.
- در صورتی که کاتتر به صورت اتفاقی خارج شده است، محل آن را با پارچه یا گاز به مدت ۱۰ دقیقه به آرامی فشار دهید.

- خون گیری و تزریق دارو از طریق کاتتر ممنوع است.
- مراقب باشید محل ورود کاتتر خیس نشود.
- از خم کردن کاتتر خودداری کنید.
- با استفاده از ثابت کننده های لوله مانند باند روی گردن، از حرکت بی مورد کاتتر جلوگیری کنید.
- در صورت باز شدن بخیه ها و یا جابجا شدن لوله ، قبل از هر کاری فوراً به پزشک مراجعه کنید.
- درپوش ها و گیره ها ی کاتتر به هیچ عنوان دستکاری نشوند.

## کاتتر دائم (پرموکت) چیست؟

- محل ورود لوله زیر پوست ناحیه ی تونل ماندی را ایجاد می کند که به صورت نوار برجسته ای در زیر پوست لمس می شود.
- این لوله در گردن یا کشاله ی ران گذاشته می شود.
- در صورت مراقبت صحیح و خون دهی مناسب این کاتتر ۶ ماه تا یک سال قابل استفاده است.
- پانسمان کاتتر بایستی بعد از هر بار دیالیز تعویض شود
- محل کاتتر باید روزانه از نظر علائم عفونت بررسی شود
- هنگام وصل و جدا شدن و به هنگام پانسمان کاتتر پرستار و بیمار هر دو ماسک داشته باشند.
- برای بیماران دیابتی تا ۱۵ روز و بیماران دیابتی تا ۳۰ روز نیاز به پانسمان دارد.
- معمولا ۱۵ روز بعد از تعبیه کاتتر می توانید به صورت معمول حمام کنید. در ۱۵ روز اول محل ورود لوله ها نباید خیس شود.



## چه نکاتی را جهت پیشگیری از عفونت کاتتر باید انجام دهم؟

- از خاراندن پوست اطراف کاتتر و دست زدن به آن خودداری کنید.
- کاتتر خود را همیشه همیشه تمیز و خشک نگه دارید. این بدان معناست که نمی توانید شنا کنید یا مستقیماً زیر دوش آب بروید.
- بهتر است قبل از دیالیز دوش بگیرید.
- بعد از حمام لازم است پانسمان کاتتر را تعویض کنید.
- پانسمان باید به روش استریل سه بار در هفته تعویض شود.
- هنگام تعویض لباس مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود.
- بر روی سمتی که کاتتر دارد نخوابید.