



کونیزاسیون چیست؟

یکی از شایع ترین بیماری های دستگاه تناسلی، سرطان دهانه ی رحم است که در صورت عدم درمان، سلامتی فرد را تهدید می کند. قرار گرفتن در معرض عفونت HPV از جمله دلایل ابتلا به این بیماری است که از طریق مقاربت جنسی منتقل می شود.

وقتی این ویروس وارد بدن می شود، سیستم ایمنی از آسیب به بدن جلوگیری می کند و به دنبال آن ویروس تا سال ها زنده می ماند و به تشکیل سلول های سرطانی دهانه رحم منجر می شود. این بیماری از طریق آزمایش پاپ اسمیر و کولپوسکوپی قابل تشخیص است و کونیزاسیون در اکثر مواقع برای بهبود بیمار موثر است.

کونیزاسیون روشی برای درمان دیسپلازی دهانه ی رحم و تشخیص سلول های پیش سرطانی است. در این روش بخشی از بافت غیرطبیعی دهانه ی رحم برداشته و جهت بررسی سلول شناسی تحت آزمایش قرار می گیرد. این درمان اغلب به دنبال غیر طبیعی بودن تست پاپ اسمیر و رسیدن به تشخیص نهایی انجام می شود. این جراحی توسط پزشک زنان و تحت بیهوشی انجام می شود.

پس از کونیزاسیون چه مراقبت هایی انجام دهم؟

- از بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت بدنی شدید خودداری کنید.
- ۴ هفته بعد از جراحی از مقاربت جنسی خودداری کنید.
- پس از جراحی از دوش واژینال پرهیز گردد.

کونیزاسیون چه عوارضی دارد؟

- ✓ خونریزی
- ✓ عفونت



✓ آسیب به اندام های مجاور مانند مثانه یا روده

HPV چیست؟

ویروس پاپیلوما‌ی انسانی از شایع ترین عفونت های دستگاه تولید مثلی است که از طریق رابطه جنسی منتقل شده و موجب طیفی از سرطان ها می گردد.

بیش از ۱۰۰ نوع ویروس HPV شناسایی شده است که ویروس نوع ۱۶ و ۱۸، از انواع سرطان زا هستند و مسئول ۷۰ درصد موارد سرطان دهانه ی رحم می باشند. ویروس نوع ۶ و ۱۱ کم خطر بوده و سرطان زا نمی باشند.

تشخیص از طریق پاپ اسمیر صورت می گیرد و توصیه می شود از سن ۲۱ سالگی و پس از تاهل هر سه سال یکبار انجام شود. پیشگیری نیز از طریق واکسیناسیون صورت می گیرد