


هواشانی

بیمارستان میلاد اصفهان
ISFAHAN MILAD HOSPITAL



آی.یو.آی (I.U.I) چیست؟




شماره تماس بخش نازایی
03135130530

IMH.PE.IVF.05/01

۵. بعد از IUI نیاز به استراحت در منزل نمی باشد
بجز در موارد داشتن دردهای رحمی، با اینحال از بلند
کردن اشیای سنگین و انجام فعالیت های ورزشی
سنگین تا مشخص شدن وضعیت بارداری خودداری
کنید.

۱۴ الی ۱۷ روز بعد از IUI آزمایش خون بارداری
انجام دهید در صورت مثبت بودن ۲ هفته بعد از تست
جهت سونوگرافی مراجعه نمایید و در صورت منفی
بودن یک ماه بعد مجدداً روز اول تا سوم قاعدگی
مراجعه نمایید.



۹. بیمار بمدت ۲۰-۱۵ دقیقه روی تخت استراحت
کرده و سپس مرخص می شود.

شانس موفقیت در عمل IUI

نکات مهم:

۱. انجام IUI درد ندارد.
۲. نیاز به بیهوشی ندارد.
۳. پس از انجام IUI خونریزی وجود ندارد ولی
در صورت استفاده از پنس جهت دستیابی به دهانه
رحم ممکن است کمی خونریزی بوجود آید.
۴. مصرف داروهایی مثل ایوپروفرن، مفنامیک اسید و...
توصیه نمی شود.

IUI یکی از ساده ترین و ارزان ترین روش های درمان ناباروری است ، که طی آن اسپرم یک لوله باریک مخصوص به درون رحم تزریق می شود. با این روش شانس رسیدن اسپرم ها به تخمک و متعاقب آن شانس باروری افزایش می یابد.

IUI در چه مواردی انجام می شود؟

۱- در مواردی که کاهش خفیف تعداد و تحرک اسپرم ها در اسپرموگرام وجود دارد
۲- در مردانی که مشکل انزال دارند.

۳- زوجینی که در روابط زناشویی دچار مشکل هستند.

۴- در موارد آندومتریوز خفیف

۵- در مواردی که کلیه آزمایشات و شرایط طبیعی است و یکسال بدون جلوگیری بارداری نداشته اند.

۶- وقتی به دلیل شرایط کاری و... زوجین نمی توانند به اندازه کافی مقاربت داشته باشند

IUI را می توان با یا بدون استفاده از داروهای تحریک تخمک گذاری انجام داد. استفاده از داروهای محرک تخمک گذاری باعث افزایش شانس باروری می شود.

۱- زوجین لازم است در اولین فرصت جهت بررسی های مقدماتی نظیر معاینه واژینال، بررسی اسپرموگرام، سونوگرافی، بررسی بازبودن لوله های رحمی و آزمایشات اولیه مراجعه نمایند.

۲- پس از بررسی های اولیه و تاثیر IUI جهت زوجین، روز اول تا سوم قاعدگی جهت سونوگرافی و دریافت دارو مراجعه نمایند.

۳- بیمار مجدداً حدود روز یازدهم الی دوازدهم قاعدگی سونوگرافی می شود و بسته به سایز تخمک ها مجدداً دارو تجویز می شود.

۴- بیمار با سونوگرافی های متوالی تا آنجا کنترل می شود که سایز تخمک ها مناسب باشد.

۵- پس از آن آمپول HCG جهت آزاد شدن تخمک تجویز می شود

۶- مناسب ترین زمان انجام **IUI** ۴۰-۳۶ ساعت پس از تزریق آمپول HCG می باشد.

۷- صبح روز IUI مایع حاوی اسپرم درون ظرف به آزمایشگاه تحویل داده می شود ، در آزمایشگاه شستشو داده می شود و عملیات خاصی روی آن صورت می گیرد تا اسپرم های نامناسب و نا سالم جدا شوند در صورتیکه نمونه اسپرم از منزل به آزمایشگاه آورده شود فاصله محل سکونت تا مرکز نبایستی بیش از نیم ساعت باشد

۸- سپس با استفاده از یک کنتور و پس از قرار گرفتن بیمار در تخت معاینه اسپرم شستشو داده شده از طریق دهانه رحم به داخل رحم هدایت و تزریق می شود.