



SPECT

آدرس: سه راه سیمین، خیابان جانبازان، انتهای
بلوار شهیدبخشی. تلفن: ۰۳۱۳۵۱۳۰۰۰۰ ،

داخلی: ۵۰۵

کد پمفلت: Pa0301

چه آمادگی هایی جهت اسکن تیروئید با TC-99 :

- همراه داشتن مدارک قبلی شامل سونوگرافی تیروئید، اسکن قبلی و آزمایشات خود در روز انجام اسکن الزامی است.
- انجام اسکن نیاز به ناشتا بودن ندارد.
- در صورت مصرف قرص های لووتیروکسین و متی مازول، این داروها از یک هفته قبل از انجام اسکن قطع شوند.
- از آوردن خانم های باردار و اطفال به عنوان همراه خودداری کنید.
- تا ۲۴ ساعت پس از دریافت دارو از خانم های باردار و اطفال فاصله ۲ الی ۳ متری را رعایت کنید.
- از پوشیدن گردنبند در روز مراجعه خودداری کنید.

- ❖ در صورت بروز گلودرد از استامینوفن استفاده کنید و جهت پیشگیری از تورم غدد بزاقی در سه روز اول آبنبات ترش مثل لیمو یا سایر مواد تحریک کننده بزاقی مصرف نمایید.
- ❖ در صورت استفراغ تا دو ساعت پس از مصرف ید روی مواد مستفرغه را با حوله یا کاغذ جاذب بپوشانید.
- ❖ در صورت بروز هر گونه مشکل و سوال دیگر به جز موارد ذکر شده می توانید با شماره تلفن ۰۳۱۳۵۱۳۰۰۰۰ و داخلی ۵۰۵ تماس حاصل نمایید.
- ❖ در آخر از بیمار خواهشمندیم پس از مراجعه به سالن بیماران و مصرف قطره ید به هیچ عنوان به سالن پذیرش بازنگردند.



چه اسکن های هسته ای در بیمارستان فوق تخصصی میلاد اصفهان انجام می شود؟

- اسکن قلب SPECT، GATED SPECT به روش تست ورزش و فارماکولوژیک
- اسکن تمام بدن با اکترونتاید و DMSA قلیایی، تالیوم و MRI.
- اسکن استخوان تمام بدن
- اسکن تیروئید و پاراتیروئید
- اسکن پرفیوژن و ونتیلیشن ریه
- اسکن کلیه (DTPA، EC، DMSA)
- اسکن DRNC (بررسی ریفلاکس ادراری)
- اسکن مجاری اشکی
- اسکن غدد بزاقی
- اسکن کبد و طحال
- اسکن کیسه صفرا و مجاری صفراوی
- اسکن تخلیه معده و ریفلاکس معده به مری
- اسکن دیورتیکول مکل
- اسکن بررسی خونریزی گوارشی
- لنفوسینتی گرافی
- اسکروتال سینتی گرافی
- ماموسینتی گرافی
- ید درمانی تا 30 mci



چه آمادگی هایی جهت ید درمانی باید انجام دهیم؟

- به بیماران توصیه می شود حتی الامکان از آوردن همراه خودداری نمایند و در صورت نیاز به همراه فقط با یک نفر بالای ۲۰ سال (به غیر از خانم باردار)
- انجام آزمایش بارداری (آزمایش BHCG) برای بیماران خانم سن ۱۲ تا ۶۵ سال در ۲۴ ساعت قبل از مراجعه الزامی می باشد.
- قرص لووتیروکسین از یک هفته قبل از انجام اسکن تیروئید با TC-99 و از یک ماه قبل از درمان و انجام اسکن با ید رادیواکتیو قطع شود.
- در صورت جراحی و خارج کردن کامل تیروئید، از دو هفته قبل مصرف نمک ید دار و

غذاهای دریایی مانند ماهی و میگو را قطع نمایید. و از اضافه کردن نمک به غذای پخته شده یا میوه ها خودداری کنید.

- سه روز قبل و سه روز بعد از درمان باید خوراکی، مصرف قرص متی مازول و به مدت ۱۲ روز قرص پی تی یو را قطع نمایید.
- چهار ساعت قبل از تجویز ید رادیواکتیو و نیز یک ساعت پس از تجویز به جز آب (به صورت استکانی و نه لیوانی) از مصرف مایعات و دارو و غذا خودداری کنید.
- از صبح روز بعد از مصرف ید به مدت سه روز هر روز حمام کنید و لباس زیر خود را تعویض کنید و لباس های قبلی را در کیسه ی نایلون قرار دهید. صبح روز چهارم لباس های تعویض شده و ملحفه های بیمار بایستی جدا از لباس بقیه ی افراد با درجه آب گرم ماشین لباسشویی با پودر در لباسشویی شسته شود.
- از زمان مصرف ید خوراکی به مدت هفت روز از قاشق و چنگال و ظرف یک بار مصرف استفاده کنید.
- توصیه می شود فاصله ی حداقل دو متری را تا یک هفته پس از مصرف با همه ی افراد(به ویژه زنان باردار و کودکان زیر ۱۲ سال حفظ کنید و از مراجعه به مطب پزشکان، مدارس، دانشگاه ها و استفاده از وسایل نقلیه عمومی بپرهیزید.